

Przygotowanie do GASTROSKOPII

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji!

Badanie planowane w godzinach porannych

- Na badanie proszę przyjść na czczo (przynajmniej 8 godzin bez jedzenia i 4 godziny bez picia).
- W dniu badania nie wolno palić tytoniu i żuć gumy.

Badanie planowane w godzinach popołudniowych (po godz. 14.00.)

- Na badanie trzeba przyjść na czczo (przynajmniej 8 godzin bez jedzenia i 4 godziny bez picia).
- Wcześniej rano ok. godz. 7.00 rano można zjeść lekkostrawne śniadanie (herbata, 1-2 bułki z masłem). Potem do 4 godzin przed badaniem można pić niegazowaną lub przegotowaną wodę).
- Potem już nic nie pić!
- W dniu badania nie wolno palić tytoniu i żuć gumy.

Ważne informacje!

- ❖ 4 godziny przed planowaną godziną badania nie pić już żadnych płynów.
- ❖ Osoby wymagające stałego leczenia np. z powodu padaczki, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, powinny zażyć poranną dawkę leków, popijając je wodą najpóźniej na 2 godziny przed gastroskopią.
- ❖ Pacjenci zwłaszcza w podeszłym wieku, osoby chore na cukrzycę czy przyjmujące leki zmniejszające krzepliwość krwi, mogą wymagać modyfikacji leczenia i wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych przed gastroskopią. Osoby te powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym i ustalić sposób postępowania.
- ❖ Osoby przyjmujące leki hamujące wydzielanie żołądkowe: inhibitory pompy protonowej (IPP), takie jak omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol lub H2-blokery (ranitydyna, famotydyna), o ile lekarz nie zaleci inaczej, powinni przerwać ich stosowanie 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem gastrokopii.
- ❖ Po odstawieniu wyżej wymienionych leków – w celu złagodzenia objawów można nadal przyjmować leki zobojętniające lub osłaniające, jak na przykład Alugastrin, Esoxx One, Gastrotuss, Maalox, Manti.
- ❖ Na badanie należy zgłosić się z wcześniejszymi wynikami badań endoskopowych i histopatologicznych.
- ❖ Istnieje możliwość dożylnego podania leków znieczulających (analgo-sedacji). W przypadku badania gastrokopowego wykonywanego w znieczuleniu dożylnym nie należy malować paznokci i zakładać biżuterii.
- ❖ Po badaniu z zastosowaniem znieczulenia dożylnego nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać potencjalnie niebezpiecznych urządzeń w tym dniu oraz konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu i

opieka w domu. Ponadto w tym dniu nie powinno się planować i podejmować istotnych decyzji.

- ❖ Po badaniu endoskopowym bez znieczulenia nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.
- ❖ Po badaniu można odczuwać wzdęcia i kurcze w jamie brzusznej powodowane przez powietrze wprowadzone do jelita przewodu pokarmowego podczas badania. Po badaniu można zastosować leki rozkurczowe np. No-spę forte 2 x 1 tbl.
- ❖ Jeśli po badaniu gastrokopowym wystąpiłyby niepokojące objawy (np. duży ból brzucha, krwawienie), należy niezwłocznie powiadomić lekarza wykonującego badanie lub lekarza prowadzącego.

Termin badania:, orientacyjna godz.
(dokładna godz. badania będzie ustalona telefonicznie 1-2 dni przed badaniem)